

A u f f o r d e r u n g.

Unsere Normalsammlung enthält verhältnissmässig äusserst wenige einheimische und exotische Nacktschnecken. Es ist aber der Wunsch vorhanden, diesen Theil ebenfalls auf einen hohen Stand zu bringen. Wir bitten daher unsere Mitglieder, uns zu unterstützen und sehen gerne Geschenken oder Anerbieten, sei es zum Tausch oder Kauf, entgegen. Sendungen wolle man adressiren an die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a. M.

Ergebnest

Sachsenhausen,
Schifferstrasse 53.

D. F. Heymann.

L i t e r a t u r.

Watson, R. Boog, Mollusca of H. M. S. Challenger Expedition.
Pts. XVII.—XX. — From Linneans Societys Journal.
Zoology vol. XVII.

Pt. XVII enthält die Eulimidae, nämlich 23 neue *Eulima*: *psila* p. 112, *fasciata* p. 113, *chaunax* p. 114, *chascanon* p. 114, *hians* p. 115, sämmtlich aus Westindien; — *ephamilla* p. 116, *Pernam*, *buco*; — *oxytata* p. 117, Philippinen; — *aconthyllis* p. 118 Honolulu; — *acerrina* p. 118 Cap York; — *sarissa* p. 119, *Pernambuco*; — *latipes* p. 120, Torresstr.; — *famelica* p. 121, Azoren; — *chyta* p. 121, Ascension; — *campyla* p. 122, Cap York; — *fallax* p. 123, Levuka; — *chydaea* p. 124, *cylindrata* p. 125, *gomphus* p. 125, *hyalina* p. 126, sämmtlich Westindien; — *amblia* p. 127, zwischen Marion und Prince Edwards Isl.; — *hebes* p. 127, Pernambuco; — *dissimilis* p. 128, Port Jackson; — *eurychada* p. 129, Cap York; — *Stylifer brychius* p. 130, südatlant. Ocean bei 2600 F.

Pts. XVIII.—XX. enthalten die Opisthobranchia. Neu sind: *Actaeon edentulus* p. 285, Kerguelen; — *chariis* p. 285, Açoren; — *turritus* p. 286, Westindien; — *austrinus* p. 287, Bass-Strasse; — *amabilis* p. 288, Canaren; — *cinereus* p. 289, Viti; — *Ringicula pusilla* p. 290, Torresstrasse; — *assularum* p. 291, ebenda; — *peracuta* p. 292, Westindien; — *Cylichna discus* p. 319, West-

indien; — tahitensis p. 320, Tahiti; — crispula p. 321, Cap York; — noronyensis p. 322, Fernando do Noronha; — reticulata p. 323, Cap York; — subreticulata p. 323, ebenda; — labiata p. 324, Amboyna; — (*Volvula*) paupercula, p. 325, Westindien; — sulcata p. 325, Torresstrasse; — *Utriculus* leptekes p. 327, Cap York; — acrobeles p. 327 ?; — avenarius p. 328 Port Jackson; — aratus p. 329, Cap York; — amboynensis p. 330, Amboyna; — pachys p. 331, Neuseeland; — oliviformis p. 332, Açoren; — spatha p. 333, Westindien; — leucus p. 334, Südatl. Ocean; — complanatus p. 335, Cap York; — tornatus p. 335, Tenerifa; — amphizostus p. 336, Cap York; — oryctus p. 337, Ascension; — famelicus p. 338, Levuka; — simillimus p. 340, Torresstrasse; — *Atys* hyalina p. 341, Levuka, Torresstrasse; — *Scaphander* mundus p. 342, Arru-Inseln; — niveus p. 343, Philippinen; — gracilis p. 345, Açoren; — *Dolabifera* triangularis p. 346, Cap.

Stearns, R. E. C., Description of a new Hydrobiinid Gastropod from the Mountain Lakes of the Sierra Nevada, with remarks on allied species and the physiographical features of the said region. — In Proc. Acad. Philadelphia 1883, p. 171—176.

Pyrgula nevadensis, die erste nordamerikanische Pyrgula. — In dem Verzeichniss der Arten der Gattung fehlt P. Thiesseae aus Griechenland.

Gredler, P. Vincenz, drei neue Clausiliarten aus China. Bozen, Selbstverlag des Verfassers.

Clausilia (*Garnieria*) Fischeri p. 1 nebst var. *Kaspari* p. 2; — *Cl.* (*Phaedusa*) *paradoxa* p. 3; — *Cl.* (*Euphaedusa*) *simiola* p. 5.

Zoologischer Jahresbericht für 1882. Herausgegeben von der zoologischen Station zu Neapel. III. *Tunicata, Mollusca, Brachiopoda.* — Leipzig 1883. 147 pp.

Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Dr. J. Brock zählt 122 Nummern auf, Systematik etc. der lebenden Mollusken von Kobelt 246, fossile 112, Brachiopoden 26.

Pini, Dr. Napoleone, un po' di luce sulla Hyalina obscurata Porro, studio analitico sintetico. — In Atti Soc. ital. Scienze nat. vol. XXVI. — 16 pp.

Der Autor beschränkt diese Art auf die Form von Genua, auf welche

die Marchesa Paulucci ihre Hyal. Porroi gegründet hat, und zählt die korsische als var. Shuttleworthiana dazu, während er Hyal. Antoniana Paul. und Blauneri Shuttl. als selbstständig anerkennt.

Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin vom 20. November 1883. No. 9.

- p. 147. *Martens, Ed. von*, über einige Landschnecken aus der Cyrenaica. — Der Botaniker Ruhmer hat bei Benghasi 11 Arten gesammelt, nämlich *Parmacella* sp., *Helix vermiculata*, *adspersa*, *melanostoma*, *pisana*, *variabilis*, *Davidiana*, *tuberculosa*, *cyrenaica* n. sp. (der Name kollidirt mit der fast gleichzeitig beschriebenen Ponsonby'schen Art), *Stenogyra decollata*, *Clausilia papillaris*, *Cyclostoma sulcatum*. Die drei nicht weit verbreiteten Arten tragen orientalischen Charakter.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.
Vol. VIII. 1883. Heft 2.

- p. 224. *Brazier, J.*, Synonymie of Australian and Polynesian Land- and Marine-Shells.
- p. 235. *Woods, J. E. Tennyson*, on some Mesozoic fossils from Central-Australia. — Neu Belemnites oxys p. 237 t. 13, fig. 1—3; — Trigonia mesembria p. 237 t. 12, fig. 1—3; — Pecten psila p. 239. Die Formation ist Kreide.
- p. 294. *Brazier, J.*, Localities of some Species of recent Polynesian Mollusca (*Melania costata* und *acanthica*).

Kobelt, Dr. W., die Muschelfischerei in Nordamerika.

In Humboldt 1883 No. 12 p. 440—443. Mit Holzschnitten, *Ensatella americana*, *Mya arenaria*, *Venus mercenaria*, *Busycon canaliculatum* *Urosalpinx cinereus*, *Neverita duplicata*, *Natica heros* und *Crepidula plana* darstellend.

Eingegangene Zahlungen.

Löbbecke, D. Mk. 21.—; Hesse, V. 21.—; Fitz-Gerald, F. 6.—; Leder, H. 21.—; Brüller, L. 15.—; Merkel, B. 6.—; Fietz, A. 6.—; Möbius, K. 6.—; Poulsen, K. 6.—; Dybowsky, N. 5.85; Heucke, D. 21.—; Tschapeck, G. 6.—; Keyzer, M. 8.—; v. Monsterberg, B. 8.—; Dietz, A. 6.—; v. Heimburg, D. 23.—; Mela, H. 21.—; Kretzer, M. 6.—; Brönnner, W. 6.—; Michael, W. 6.—; Poppe, W. 6.—

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Hierzu die Beilage Tauschverzeichniss No. 1.